

Vorsorgeuntersuchung der Österreichischen Sozialversicherung Allgemeines Programm für Frauen und Männer

Seite 1/2

Daten des Probanden		Sozialversicherungsnummer - TT - MM - JJ 1 1 8 5 - 2 7 - 1 2 - 6 5		
Name und Anschrift Michael Knöbl		versichert bei:		
Liebenauer Hauptstr. 93b/7/43		GKK St		
8041 Graz-Liebenau Geschlecht ⊠ männlich □ weiblich		Versicherungsstatus ☑ erwerbstätig, AMS ☐ Pensionist ☐ Kriegshinterbliebener		☐ Fremdstaaten ☐ EU-Abkommen ☐ nicht versichert
Klinische Untersuchung				Empfohlene Maßnahmen
Kopf / Hals unauff				
ab 65 Jahren Hörverminderung (Ergebnis Flüstertest) Sehschwierigkeiten (Anamnesebogen)				□ ÜW zum HNO-FA □ ÜW zum Augen-FA
Herz / Lunge / Gefäße rhythm,nc, FP tb				
Abdomen kein DS				
WS / Gelenke unauff				
Haut susp Hautläsion re US				
Hautkrebs von Proband/in angegebene Auffälligkeiten □ Ja ☒ Nein □ bestätigt bösart. Melanom bei Verwandtem 1. Grades □ Ja ☒ Nein □ unklar				□ keine □ Selbstbeobachtung ☑ ÜW zum Haut-FA
sonstige auffällige Befunde				
Parodontitis-Risikoklasse gesundes Zahnfleisch Zahnstein/Plaque/Mundgeruch/Rauchen/Hormonveränderung (zB. Pubertät, Wechseljahre)/Diabetes mellitus/motorisches Hygieneerschwernis □ ja □ nein			 ☑ 0: sorgfällt. Reinigung alle 24h ☐ 1: Empfehlung z. fachger. Pflege ☐ 2: Überweisung zum Zahnarzt 	
Rötung/Schwellung/Lockerung □ ja ☑ nein				
Rotes Blutbild (Frauen) Ery Blutzucker 118 Hb g/dl Tri	Chol/ OL-Chol 8,0 glyceride 308 a/dl amma-GT 80	Harnuntersuchuneg Leukozyten Glucose Nitrit Eiweiß Blut Ubg	pos	 □ Diagnosesicherung ☑ Befundbesprechung □ weiterg. Laborunters. veranlasst □ Wiederholung d. Laboruntersuchung
□ Blutdrucksenkendes Medikament eingenommen □	ideal (<120/80) normal (120-129/80) noch normal (130-13) Hypertonie Stadium Hypertoniestadium 2 isolierte systolische	39/85-89) 1 (140-179/90-109)	0)	☐ Diagnosesicherung ☐ Hypertonieschulung ☐ weiterführ. Therapie
☐ Taille: M <102, F <88 cm ☐ Taille: Umfang größer ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	< 18,5 18,5 - 24,9 25,0 - 29,9 Prädipos 30,0 - 34,9 Grad I A 35,0 - 39,9 Grad II Ad > = 40,0 Grad III Ad	dipositas dipositas		☑ Ernährungsberatung ☐ Bewegungsberatung